



A szérumban mért HIV-1 RNS szintek és az AIDS kifejlődéséig eltelt idő közötti összefüggés a Multicentrikus Hemofilia Cohort Vizsgálatban

Cikk: O'Brien T.R. és mtsai - JAMA 276, 105, 1996

A HIV-1 szérumban történő kimutatás az AIDS kialakításának első jele, de az AIDS kialakulásáig még sokáig tartozhat. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek.

A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek.

A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek.

A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek.

A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek.

A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek.

A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek. A HIV-1 RNS szintek az AIDS kialakulása előtt magasak, majd az AIDS kialakulása után csökkennek.