



# Zidovudine-rezisztens HIV-1 prevalenciája gyorsan progrediáló HIV betegségben

**Cikk:** Garcia-Lerma, G. és mtsai. - AIDS 11, 1292, 1996

Egyes új megfigyelések arra mutatnak, hogy az AIDS-es betegeknél valószínűleg ritkábban fordul elő a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegség. Ennek vagy az az oka, hogy a fertőzés előtti vagy kezdeti szakaszban a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségben szenvedők kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, vagy az, hogy az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál. Az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál. Az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál.

17 évesen megkezdett kezeléssel rendelkező HIV-1-vel fertőzött betegek esetében a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségben szenvedők kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál. Az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál.

A 17-ből 4 betegben megfigyeltek HIV-1-vel fertőzött betegek esetében a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségben szenvedők kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál. Az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál.

Kontrollálható állapotot a vizsgálati elvégzéséig 12 hónapig megfigyeltek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál. Az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál.

Személyek eredményeire vonatkozóan azonosították azokat az HIV-1-vel fertőzött betegeket, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál. Az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál.

Kevesebb HIV-1-vel fertőzött betegek esetében a HIV-1-vel gyorsan progrediáló betegségben szenvedők kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál. Az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál.

A jelen cikkben leírtak mellett más megfigyelések is megfigyeltek, hogy az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál. Az AIDS-es betegek kevesebb HIV-1-vel rendelkeznek, mint az AIDS-es betegek, akiknél az AIDS-es betegség gyorsan progrediál.