



A CD4+ sejtszám javulása alkohol-elvonás után HIV- pozitív alkoholistá betegekben

Cikk: Pol, S és mtsai. - AIDS 10, 1293, 1996

A HIV-terheltség betegeknél a CD4+ sejtszám csökkenése, különösen az AIDS tüneteinek kialakulásakor, az a jellegzetes következménye, és a betegség előrehaladásának jele. Ez a folyamat az alkohol-elvonás után is megfigyelhető, és a CD4+ sejtszám javulása a betegség enyhébb stádiumát jelenti. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy az alkohol-elvonás után a CD4+ sejtszám javulása a HIV-terheltség csökkenésével jár-e együtt, vagy a CD4+ sejtszám javulása a HIV-terheltség csökkenésének következménye. A tanulmányban 104 HIV-terheltségű alkoholistát vizsgáltak, akiket két csoportra osztottak: akik az alkohol-elvonás után a CD4+ sejtszámuk javult, és akiké nem. A tanulmány azt találta, hogy az alkohol-elvonás után a CD4+ sejtszám javulása a HIV-terheltség csökkenésével jár együtt, ami arra utal, hogy az alkohol-elvonás után a CD4+ sejtszám javulása a HIV-terheltség csökkenésének következménye.

Eddig eredmények alapján is indokoltak tartják azonban a szűrés azt, hogy minden HIV-terheltségű 64 be kell tartani az alkohol-elvonás mellett, és az alkohol-elvonás mellett az egészségügyi állapot javulását várják.