

# A szexuálisan átvihető betegségek (STD) hatékonyabb kezelésének befolyása a HIV-fertőzés előfordulására Tanzániában: randomizált kontrollált vizsgálat

Cikk: Grosskurth H. és mtsai - Lancet 346, 530, 1995

1994 végére a földközi tenger térségében a szexuálisan átvihető betegségek (STD) előfordulása megkérdőjelezhetően a legmagasabb volt a világon. Az új típusú HIV-fertőzés előfordulása ebben a térségben a leggyorsabban növekedett. A szexuálisan átvihető betegségek megelőzése a HIV-fertőzés megelőzése szempontjából kulcsfontosságú. A szexuálisan átvihető betegségek megelőzésének hatását vizsgáló randomizált kontrollált vizsgálatot végeztünk Tanzániában a Victoria-tó térségében. A vizsgálatban a szexuálisan átvihető betegségek megelőzésének hatását vizsgáltuk. A vizsgálatban a szexuálisan átvihető betegségek megelőzésének hatását vizsgáltuk. A vizsgálatban a szexuálisan átvihető betegségek megelőzésének hatását vizsgáltuk.

A vizsgálat célja a szexuálisan átvihető betegségek megelőzésének hatását vizsgálni a HIV-fertőzés megelőzése szempontjából. A vizsgálatban a szexuálisan átvihető betegségek megelőzésének hatását vizsgáltuk. A vizsgálatban a szexuálisan átvihető betegségek megelőzésének hatását vizsgáltuk. A vizsgálatban a szexuálisan átvihető betegségek megelőzésének hatását vizsgáltuk.