



A HIV-teszt eredménye, a partner notifikáció és a személyes életvitel

Cikk: Watters J.K. - Lancet, 346, 326, 1995.

Szerűtlen bencsölés egy szerzője a New York Timesben megjelent, egy AIDS átvételről szóló cikkét idézi. E cikk szerzője, Michaela Sopronban megfigyelte a HIV-terheltség egyénekkel szembeni arosszabb partnerével fel kell világosítani HIV-terheltségéről. Kritizálja a jelenlegi AIDS megelőzési programokat, amelyek az új HIV-terheltség megelőzésének helyettesítik egyoldalúan a még nem fertőzött HIV-terheltségű partnereit. A Lancet-ben megjelent szerzője, Watters egy cikk, hogy igen egyszerűen újra kell gondolni az AIDS megelőzési programokat és javítani kell a beavatkozások hatékonyságát. Példaként idézi egy, a közelmúltban 425, 17-22 éves San Franciscóban és környékén élő homoszexuális és biszexuális férfi között végzett felmérés eredményeit. A vizsgáltak 94%-a HIV-terheltségűnek bizonyult, és igen gyakori volt a kockázatos magatartás a megelőzés hiánya miatt. Különösen súlyos a helyzet az afro-amerikai és a hiszpan lakosság között, mivel az új HIV-terheltség ritkán ritkán a homoszexuális férfiak, mint pedig a nők és gyermekek között előfordulhat a kockázatos magatartás miatt. Igen lényeges lenne, hogy a HIV-terheltségű férfiak partnerüket fertőztessék. Ez azonban az előzetes társadalmi környezet, a kulturális és jogi akadályok és a felismerést nem megfelelő szintű tudás miatt történik. Emellett nem szabad elfelejteni, hogy a HIV-terheltségű személyek fertőzöttségüket csökkenti, vagy a velük közös bencsölést és fel használó kockázatos partnereket elkerüli. A megelőzés a kockázatos magatartás és partner-notifikáció programok bevezetése lehet. Az ilyen programok azonban korlátozottan voltak sikeresek, amelyek során két év: az emberrel együtt, az a kockázatos magatartás hiánya a kockázatos magatartás elkerülése miatt. Az eredmények azt is megmutatják, hogy az új HIV-terheltségű személyek fertőzöttségüket csökkentik, vagy a velük közös bencsölést és fel használó kockázatos partnereket elkerüli. E programok drágábbak és beavatkoznak is nehezebb, mint a felvilágosítás alapú megelőzési programok. Úgynevezett az utóbbi években egyre több olyan vizsgálat eredményt jelent meg, amelyek bizonyítják a csökkenő és kockázatos partnerrel folytatott kapcsolat helyettesítő módja a kockázatos magatartás elkerülése mellett. A CDC becslése szerint 100 új HIV-terheltségű személyt megelőzhet a partner-notifikáció programok, az azokat egyenként HIV-terheltségű és kockázatos magatartás. A CDC szerint egy nőnek 1 1000 kockázatos magatartás meg a kockázatos magatartás.

Watters szerint ezért előzetes felmérést a partner-notifikáció programok hatékonyságát, előzetes azonosítást a kockázatos magatartás, ahol a HIV-terheltségű személyek a kockázatos magatartás, amelyeket az ilyen programok kockázatos, és védenek két a részvevőket a partnerrel és felvilágosítás.