



# A fertőző betegségek és a rosszindulatú daganatok előfordulásának változásai a HIV-infekcióban meghalt személyek között az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között

**Cikk:** Selik R.M. és mtsai - Ann. Intern. Med. 123, 933, 1995.

A HIV-infekció által okozott immundeficiencia következtében különböző fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok fejlődnek ki. E műveletben megfigyeltek által okozott halálosan károsító vírusos kórokozók az a betegségek megelőzése és kezelésére alkalmazott eljárások hatékonyságát. Az ilyen tanulmány megfigyelést meg lehet követni azt is, hogy mely betegségek csökkentése van előnyös a prevenció és a terápia további fejlesztése.

Statisztika a kórokozók hirtelen bekövetkező elhalálosító hatásaitól a fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok előfordulásának változásait. A Nemzeti Egészségügyi Statisztikai Központban (National Center for Health Statistics) megfigyelték a fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok előfordulását az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között. A statisztika a fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok előfordulását az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között vizsgálta. A statisztika a fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok előfordulását az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között vizsgálta. A statisztika a fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok előfordulását az Egyesült Államokban 1987 és 1992 között vizsgálta.

**Előzetes:**  
1987 és 1992 között 140 461 esetben diagnosztizáltak HIV-infekciót. Közülük 104 831 esetben (74%) csupán a HIV-infekció volt a halál oka. A halálozás természetesen elvándorolt a vírusos fertőzések felől a rosszindulatú daganatok felé. A halálozás természetesen elvándorolt a vírusos fertőzések felől a rosszindulatú daganatok felé. A halálozás természetesen elvándorolt a vírusos fertőzések felől a rosszindulatú daganatok felé.

1987 és 1992 között 140 461 esetben diagnosztizáltak HIV-infekciót. Közülük 104 831 esetben (74%) csupán a HIV-infekció volt a halál oka. A halálozás természetesen elvándorolt a vírusos fertőzések felől a rosszindulatú daganatok felé. A halálozás természetesen elvándorolt a vírusos fertőzések felől a rosszindulatú daganatok felé.

A halálozás természetesen elvándorolt a vírusos fertőzések felől a rosszindulatú daganatok felé. A halálozás természetesen elvándorolt a vírusos fertőzések felől a rosszindulatú daganatok felé. A halálozás természetesen elvándorolt a vírusos fertőzések felől a rosszindulatú daganatok felé.

Nem találtak különbséget a rosszindulatú daganatok előfordulásának gyakoriságában a férfiak és a nők között, illetve a fehérek és a sárga bőrűek között.

**Megbeszélés:**  
A fertőző betegségek és rosszindulatú daganatok előfordulásának gyakoriságában a férfiak és a nők között, illetve a fehérek és a sárga bőrűek között.

1) A kórokozók egy része azonos a HIV-infekcióval, amely a HIV-infekcióban meghalt rosszindulatú daganatok 1987-ben az esetek közel egynegyedét tették ki. 1992-re azonban ez lecsökkent a betegek kb. egynegyedére. Ha azonos a kórokozók egy része azonos a HIV-infekcióval, amely a HIV-infekcióban meghalt rosszindulatú daganatok 1987-ben az esetek közel egynegyedét tették ki. 1992-re azonban ez lecsökkent a betegek kb. egynegyedére.

2) Azok a betegek, akik egy fertőző betegség következtében haltak meg, azok a betegek, akik egy fertőző betegség következtében haltak meg, azok a betegek, akik egy fertőző betegség következtében haltak meg.